

	Autres caractéristiques (topographie, forme, couleur, surface, consistance)	Explication physiopathologique	Orientation étiologique
Lésion superficielle	non folliculaire, souple	<i>hyperacanthose, hyperkératose, épaissement corps muqueux</i>	verru plane <u>img_11_47.jpg</u>
	ombiliquée	<i>acanthose, kératinocytes en grappe avec inclusion</i>	molluscum contagiosum <u>img_11_19.jpg</u>
	folliculaire, rugueuse	<i>hyperkératose</i>	kératose folliculaire <u>img_11_28.jpg</u> pityriasis rubra pilaire <u>img_11_8.jpg</u> miliaire sudorale
Lésion Infiltrée	rouge, acuminée		urticaire
	oedémateuse, en peau d'orange	<i>œdème dermique</i>	<u>img_11_31.jpg</u>
	purpurique	<i>extravasation de globules rouges et infiltrat dans le derme</i>	vascularite <u>img_11_36.jpg</u>
	fixe, ferme	<i>dépôt amorphe par surcharge métabolique</i>	mucinoase, amylose, xanthome
	érythémateux, inflammatoire	<i>infiltrat cellulaire dermique</i>	syphilis, lymphome, dermatomyosite <u>img_11_48.jpg</u>
Mixte	pourpre avec réseau blanchâtre, squameux (réseau de Wickam)	<i>hyperplasie épidermique + infiltrat dermique</i>	lichen amyloïde <u>img_11_49.jpg</u> lichen plan <u>img_11_50.jpg</u>