

TRANSITOIRES (= facteurs déclenchants)	PERMANENTS
<ul style="list-style-type: none"> - Chirurgie : surtout orthopédique et abdomino-pelvienne. - Traumatologie : fractures, contusions, entorses. - Obstétrique : grossesse, accouchement, césarienne, postpartum, avortement. - Décubitus ou immobilisation prolongée : alitement, paralysie, plâtre, voyage > 6 heures. - Abord vasculaire (cathéter central ou périphérique). 	<ul style="list-style-type: none"> - Âge > 75 ans. - <i>Hérédité (arbre généalogique) :</i> antécédents personnels ou familiaux de Maladie Thrombo-Embolique Veineuse (MTEV) : phlébite et embolie pulmonaire. - <i>Thrombophilies constitutionnelles ou acquises.</i> - <i>Cancers et leucémies, syndromes myéloprolifératifs, dysglobulinémies.</i> - Maladies inflammatoires : infections chroniques, entéroopathies inflammatoires, Lupus / Behçet / Buerger. - Médicaments : œstro-progestatifs (<u>Attention</u> : association contraception orale + tabac = risque ↑) chimiothérapies. - Maladies cardio-vasculaires : insuffisance cardiaque, insuffisance veineuse chronique (varices). - Compression veineuse. - <i>Obésité .</i>