

ROT	Examen	Réponse	Lésion
Bicipital	Patient : assis ou couché, coude demi-fléchi, paume vers le bas ; Examineur : placer son pouce sur le tendon bicipital du patient, au pli du coude, et percuter son pouce.	Flexion du coude <i>par contraction des biceps et brachial.</i>	C5-(C6)
Stylo-radial	Patient : coude fléchi, bord radial vers le haut ; Examineur : percuter au dessus de la styloïde radiale.	Flexion du coude <i>par contraction des brachio-radial, biceps et brachial.</i>	(C5)- C6
Tricipital	Patient : assis ou couché, coude fléchi, paume vers son corps ; Examineur : percuter le tendon du triceps brachial au dessus de l'olécrâne.	Extension du coude <i>par contraction du triceps.</i>	(C6)-C7-(C8)
Ulnaro-pronateur	Patient : assis ou couché, coude fléchi, main sur la cuisse ; Examineur : percuter la styloïde cubitale.	Pronation de l'avant-bras.	C8
Patellaire	Patient : en décubitus dorsal (l'examineur soutient le membre inférieur, genou demi-fléchi) ou assis jambes pendantes ; Examineur : percuter le tendon patellaire, sous la patella (rotule).	Extension du genou <i>par contraction du quadriceps.</i>	(L3)-L4
Achilléen	Patient : en décubitus dorsal, genou légèrement fléchi (l'examineur tient et fléchi le pied) ou à genoux, les pieds pendants dans le vide ; Examineur : percuter le tendon d'Achille.	Extension de la cheville <i>par contraction du triceps sural.</i>	S1
Massétérin	Patient : bouche semi-ouverte ; Examineur : poser son index horizontalement au dessus du menton du patient et percute son index de haut en bas.	Fermeture de la bouche <i>par contraction des masséters.</i>	Protubérance (V)