

RCM	Examen	Réponse normale	Anomalie
Cutané Plantaire (RCP)	Patient détendu, en décubitus dorsal. Stimuler le bord externe de la voûte plantaire avec une pointe mousse en allant du talon vers les orteils.	- RCP normal : flexion de l'hallux (gros orteil). - RCP indifférent (absence de réponse) : variante de la normale, ou évolution pathologique si ce réflexe était auparavant en flexion.	- Signe de Babinski : extension lente et majestueuse de l'hallux avec écartement en éventail des autres orteils <i>img_5_2.jpg</i> = syndrome pyramidal
Cutanés Abdominaux (RCA)	Patient : détendu, en décubitus dorsal . Stimuler la paroi abdominale avec une pointe mousse en grattant de l'extérieur vers l'ombilic : 1- hypochondre vers l'ombilic = RCA supérieur 2- flanc vers l'ombilic = RCA moyen 3- fosse iliaque vers l'ombilic = RCA inférieur.	Attraction de l'ombilic vers la zone stimulée par contraction des muscles abdominaux.	Abolition : lésion racine - RCA supérieur : T6-T8 - RCA moyen : T8-T10 - RCA inférieur : T10-T12 ou voie pyramidale sus-jacente (syndrome pyramidal)
Crémastérien	Stimulation de la face interne de la cuisse avec une pointe mousse.	Ascension du testicule homolatéral ou rétraction de la grande lèvre vulvaire.	Abolition : lésion racine L1-L2 ou voie pyramidale sus-jacente (syndrome pyramidal)
Cornéen	Attouchement de la cornée (et non de la sclère) avec un coton stérile.	Fermeture de la paupière.	Abolition : V et/ou VII
Nauséux	Stimulation du 1/3 postérieur de la langue, de la tonsille ou du palais mou avec un abaisse langue.	Mouvement de vomissement.	Abolition : IX