

	Urétrite aiguë	Prostatite aiguë
<i>Explication physiopathologique :</i>		
Mécanisme	Infection du canal urétral (IST)	Infection de la prostate, par voie rétrograde urétrale sur : urétrite chez le sujet jeune (IST), hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) chez le sujet âgé (germes urinaires)
SIGNES GÉNÉRAUX :		
	Aucun	Fièvre AEG
ANAMNESE :		
Contexte clinique	Rapports sexuels à risque (non protégés, partenaires multiples)	Rapports sexuels à risque (sujet jeune), HBP (sujet âgé)
Signes fonctionnels	Frissons Douleurs pelviennes Brûlures mictionnelles	Frissons Douleurs pelviennes Brûlures mictionnelles, pollakiurie, impériosité, dysurie
INSPECTION :		
	- Urines Claires - BU : Leucocytes + - ± Écoulement urétral jaunâtre (<i>Gonocoque</i>), incolore (<i>Chlamydia</i>) - Recherche de chancre, ulcération (IST)	- Urines Troubles - BU : Leucocytes + Nitrites + si BGN (germes uréase +) - Recherche urétrite associée - Recherche de chancre, ulcération (IST)
PALPATION :		
	- Recherche funniculite, orchio-épididymite associées - TR ; Recherche prostatite associée	- Recherche funniculite, orchio-épididymite associées - TR : Prostate augmentée de volume, douloureuse
EXAMENS COMPLÉMENTAIRES :		
Microbiologie	- <u>Prélèvement endo-urétral (grattage) et de l'écoulement avec examen direct, immunofluorescence (<i>Chlamydia</i>) et mise en culture (gélose chocolat pour <i>Gonocoque</i>)</u> - <u>ECBU sur le 1^{er} jet, avec PCR <i>Chlamydia</i></u> - <u>Sérologies VIH (avec accord de la patiente), syphilis (TPHA-VDRL), hépatite B (IST)</u>	- <u>Hémocultures</u> - <u>ECBU sur le 2^{ème} jet (seuil de positivité : $\geq 10^4$ UFC/mL)</u> - ± <u>Prélèvement urétral</u> - <u>Sérologies VIH (avec accord de la patiente), syphilis (TPHA-VDRL), hépatite B (IST)</u>
Imagerie	Non	Echographie prostatique pelvienne (endo-rectale contre-indiquée en phase aiguë) si complication
Orientation étiologique :		
Germe	- IST : <i>Gonocoque</i> , <i>Chlamydia</i> , <i>Mycoplasme</i>	- IST : <i>Gonocoque</i> , <i>Chlamydia</i> , <i>Mycoplasme</i> - Germes urinaires : <i>E. coli</i> (70 % des cas)
COMPLICATIONS :		
	1. Orchi-épididymite 2. Prostatite 3. Sténose urétrale	1. Abcédation 2. Choc septique 3. Rétention aiguë d'urine 4. Orchi-épididymite 5. Prostatite chronique